ZMK (32)12 2016, S. 826–830

Univ.-Prof. Dr. Katrin Bekes, MME

Frühzeitiger Milchzahnverlust und Lückenhalter in der Kinderzahnheilkunde

[1] Borutta A, Wagner M, Kneist S: Bedingungsgefüge der frühkindlichen Karies. Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 32, 58–63 (2010).
[2] Brothwell DJ: Guidelines on the use of space maintainers following premature loss of primary teeth. J Can Dent Assoc 63, 753–765 (1997).
[3] Colak H, Dulgergil CT, Dalli M, Hamidi MM: Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and treatments. J Nat Sci Biol Med 4, 29–38 (2013).
[4] Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e. V. (DAJ). Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe 2009. Bonn: 2010.
[5] Filippi A, Krastl G: Traumatologie im Milch- und Wechselgebiss. Quintessenz 58, 739–752 (2007).
[6] Gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für ZMK, der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGK) und der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO). Indikation und Gestaltung von Lückenhaltern nach vorzeitigem Milchzahnverlust. DZZ 59, (2004).
[7] Hirsch C, Blechschmidt B, Kleeberg L: Risikofaktoren für das Nursing-Bottle-Syndrom. Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 22, 103–109 (2000).
[8] Law CS: Management of premature primary tooth loss in the child patient. J Calif Dent Assoc 41, 612–618 (2013).
[9] Simon T, Nwabueze I, Oueis H, Stenger J: Space maintenance in the primary and mixed dentitions. J Mich Dent Assoc 94, 38–40 (2012).
[10] Splieth CH, Treuner A, Berndt C: Orale Gesundheit im Kleinkindalter. Präv Gesundheitsf 4, 119–123 (2009).
[11] Steffen R, van Waes H: Unterminierende Resorption – ektopischer Durchbruch des ersten Molaren: Zwei Begriffe – ein Problem. Inf Orthod Kieferorthop 45, 227–234 (2013).